



As tubas e o desenvolvimento do carcinoma do ovário - Papel do Cirurgião -

Vinícius Grando Gava
Cirurgião Oncológico
Hospital Moinhos de Vento

Conflito de Interesses

- Speaker da Roche




Generalidades

- 1/70 risco de desenvolver carcinoma do ovário
- Sem estratégias de rastreio efetivas
- Tumores de baixo grau (tipo I) e alto grau (tipo II)
- Tumores epiteliais responsáveis por 90% dos óbitos
- Mutações genéticas
- Dados sugerem que ligadura tubária poderia diminuir risco de carcinoma (HGSC RR 0,77)

High grade serous ovarian carcinomas originate in the fallopian tube

S. Intidhar Labidi-Galy^{1,13}, Eniko Papp^{2,14}, Dorothy Hallberg², Noushin Niknafs^{2,3}, Vilmos Adleff², Michael Noe², Rohit Bhattacharya^{2,4}, Marian Novak^{1,14}, Siân Jones⁵, Jillian Phallen², Carolyn A. Hruban², Michelle S. Hirsch⁶, Douglas I. Lin^{6,15}, Lauren Schwartz⁷, Cecile L. Maire¹, Jean-Christophe Tille⁸, Michaela Bowden⁶, Ayse Ayhan^{9,10,11,12}, Laura D. Wood², Robert B. Scharpf², Robert Kurman^{2,12}, Tian-Li Wang^{2,12}, le-Ming Shih^{2,12}, Rachel Karchin^{2,3}, Ronny Drapkin^{1,6,16} & Victor E. Velculescu²



Salpingectomia de Oportunidade


- Remoção das trompas em cirurgia pélvica por outro motivo
- Prevenção de carcinoma do ovário, primário do peritônio e trompas
- Pacientes de risco habitual e não elevado

Quem é o risco habitual?

- > 18 anos
- Sem história familiar de carcinoma de ovário, mama ou cólon
- Ausência de mutação BRCA

Quando

- Histerectomia para condições benignas
 - Se vaginal (se tecnicamente factível, não converter)
- Salpingectomia e não ligadura*



E os ovários?

- Função preservada



O que precisamos?

- Dados com longo seguimento....
 - 2011 RANZCOG
 - 2013 SGO
 - 2014 RCOG
 - 2015 ACOG
 - 2015 AGO
 - 2018 KSOG